



Minister Zdrowia

Warszawa, 01 września 2021

ZPŚ.641.188.2021.JK

### **Komunikat nr 11 Ministra Zdrowia**

#### **w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką dodatkową (stosowaną po pełnym schemacie szczepienia)**

Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, jest możliwe podanie dodatkowej dawki szczepienia, nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia pełnego schematu szczepienia, u następujących osób z zaburzeniami odporności:

1. otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
2. po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
3. po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
4. z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
5. z zakażeniem wirusem HIV;
6. leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
7. dializowanych przewlekłe z powodu niewydolności nerek.

**Dodatkową (trzecią) dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie  $\geq 28$  dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19:**

- **u osób wieku  $\geq 18$  lat** należy stosować szczepionki mRNA (Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna),

- u dzieci 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech.

Zalecenia te mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącej podawania dodatkowej (trzeciej) dawki dla każdego z ww. preparatów.

Do podania dodatkowej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 należy stosować ten sam preparat (Comirnaty Pfizer-BioNTech lub Spikevax Moderna), którym zrealizowano 2-dawkowe szczepienie. W sytuacji jeżeli preparat ten jest niedostępny, można podać inny preparat mRNA. Zalecenie to dotyczy osób w wieku  $\geq 18$  lat.

**Aktualnie nie ma wystarczających danych wskazujących na zasadność podawania dodatkowej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 u osób z niedoborem odporności zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki Vaxzevria (AstraZeneca) lub pojedynczą dawką szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.**

Nie należy podawać więcej niż trzech dawek szczepionki mRNA przeciwko COVID-19.

#### **Informacje dodatkowe**

- Przy ocenie stanu układu odporności pacjenta należy uwzględnić stopień ciężkości choroby, czas jej trwania, stan kliniczny pacjenta, powikłania, choroby współistniejące oraz każdą potencjalnie immunosupresyjną terapię.
- Jeżeli to możliwe, dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 (zarówno dawki szczepienia podstawowego, jak i dawkę dodatkową) należy podać  $\geq 2$  tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę.
- Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie.
- W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania dla osób uprawnionych, lekarz może wystawić skierowanie samodzielnie.
- Wystawienie przez lekarza skierowania na dodatkową (trzecią) dawkę dla osób spoza ww. grup pacjentów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność lekarza.

- Wymagania dla osób kwalifikujących i wykonujących szczepienia są takie same jak w przypadku każdego innego szczepienia przeciwko COVID-19.
- W przypadku wątpliwości punkt szczepień może skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Z poważaniem  
z upoważnienia Ministra Zdrowia  
Anna Goławska  
Podsekretarz Stanu  
*/dokument podpisany elektronicznie/*

**Zał. do komunikatu nr 11. ASPEKTY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z PRAWIDŁOWYM  
WPISANIEM DO SYSTEMU DODATKOWEJ DAWKI SZCZEPIENIA (MODEL 3/3)**

## ASPEKTY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z PRAWDŁOWYM WPISANIEM DO SYSTEMU DODATKOWEJ DAWKI SZCZEPIENIA (MODEL 3/3)

Informujemy o wprowadzeniu od 1 września 2021 roku możliwości rejestracji trzeciej dawki szczepienia dla osób z grup wskazanych przez Radę Medyczną.

Przygotowano reguły weryfikujące poprawność rejestracji trzeciej dawki. Jest to możliwe w przypadku pacjentów, którzy przyjęli uprzednio cykl 2-dawkowego szczepienia podstawowego, znajdują się w wyznaczonej grupie i mają wystawione skierowanie na kolejne szczepienie.

Rejestracji trzeciej dawki, w powyżej opisanych przypadkach, **można dokonać w aplikacji gabinet.gov.pl**. W tym celu należy wprowadzić dane dotyczące szczepienia jak dotychczas, ponadto należy wpisać wartość „3” jako *Numer podawanej dawki* oraz *Liczba dawek (3/3)*. Przykład prawidłowego uzupełnienia danych został przedstawiony poniżej:

**Wprowadź dane szczepienia COVID**

Zapisz jako szablon Wyczyść formularz

Dane o badaniu kwalifikacyjnym

Wydano w wersji papierowej  Wydano w wersji elektronicznej

Rola pracownika medycznego \*

Pracownik medyczny \*  NPWZ \*

Data i godzina \* 01-09-2021 17:22

Dane o szczepieniu

Szczepionka \* Comirnaty, Szczepionka przeciw COVID-19, Pfizer, 195 fiolek, 5 dawek, 59... X

Numer serii \*

Data i godzina wykonania szczepienia \* 01-09-2021 17:22

Wykonana procedura \* 99.557 - Szczepienie przeciw COVID-19

Miejsce podania szczepienia \* Lewe ramię Sposób podania szczepienia \* Iniekcja domięśniowa

Numer podawanej dawki \* 3 1 2

Liczba dawek \* 3

Ilość podanej szczepionki \* 0.3 Jednostka \* ml

Finansowanie szczepienia \* Publiczne - szczepienie w punkcie szczepień

Informacje dodatkowe

\* To pole jest wymagane.

Zapisz i zakończ wizytę Zapisz szczepienie